

《注意事項》

- ・この検診票は本人以外は使用できません。
- ・検診を希望される方が大勢おられますので、予約の変更はできるだけお避けください。
- ・偶発症の多くが、前処置に用いる鎮痛剤・鎮静剤などによるものである為、検診においては使用しませんのでご了承ください。

《胃内視鏡検診が受診できない方》

- ・消化性潰瘍などの胃疾患で受療中の方（ピロリ除菌中の者を含む）
- ・胃全摘術後の方
- ・のどや鼻などの疾患をお持ちで、内視鏡の挿入ができない方
- ・血圧が極めて高い方（検査直前に血圧を測り、受診の可否を判断します）



大和高田市
マスコット
キャラクター
みくらん

※検診部位に対して、治療や経過観察中の方、既に何らかの症状がある方は、がん検診の対象外になります。

※生活保護世帯・市民税非課税世帯に属する方は検診費用が全額免除になります。事前に検診票を持って、保健センター窓口へ申請ください。（7/1以降に検診を受けられる場合は前年所得（2020/1/1～12/31所得）で課税状況の確認をさせていただきます。→申請がないまま検診を受診した場合は、検診費用を返金することができませんのでご注意ください。

胃がん（胃カメラ）検診の受け方

1 検診票到着後、医療機関に検診の申込みをする（受診期間：2022年2月末まで）
 下記の医療機関に早めに予約をしてください。
 各医療機関の検診受入れ人数に限りがあります。定員になり次第締め切りますが、ご了承ください。
 予約時に、「大和高田市の検診」であることを必ず伝えてください。

2 問診票と同意書を記入する

【検査前日および当日の注意事項】

検査前日の夕食は消化の良いものを食べて、夜8時以降は飲酒やタバコ、コーヒーなどは避け、水以外は口にしないでください。検査当日は絶飲絶食になります。血圧や心臓の薬を服用されている方は、起床時（検査3時間くらい前までに）にコップ1杯の水で服用してください。

3 胃がん（内視鏡）検診を受診する（※有効期限をすぎると検診票は使用できません）

【持ち物】 検診票（水色複写用紙）、同意書、問診票（黄色）、健康保険証、お薬手帳、検診費用、未使用のマスク、

4 検診結果

検査終了時に結果票の引き替え用紙をお渡しし、3週間後以降に本人が受け取りに行く。受け取りが困難な場合は、郵送も可能。

※異常なしの方 → 今後も2年に1度の検診を！
 （胃カメラの次年度はカメラバリウムも不可）
 ※精密検査の方 → 主治医にご相談ください（保険診療）

医療機関名	TEL	検診内容	検診日時	持ち物
香芝生喜病院 <small>（香芝市穴虫3300番地3番）</small>	0745 44-8037 月～土14時～16時 <small>（日祝を除く）</small>	経口 経鼻	月・火・木・金・土 9時30分～11時30分 ※検査当日は、30分前に来院後、血圧の測定、問診票の確認などあり。	【持ち物】 検診票、同意書、問診票、健康保険証、お薬手帳、検診費用、未使用の使い捨てマスク（サージカルマスク）、タオル1枚 ※未使用のマスクに穴をあけ、穴を開けたマスクを装着した状態でカメラを実施します。
中井記念病院 <small>（大和高田市根成柿151-1）</small>	21-1100 月～金13時～17時 現在、休止中	経口 経鼻	月～土 9時～	※検診票を忘れた場合は、受診することができません。 ※生検やピロリ菌検査が行われた場合は、保険診療として別途請求があります。

※いずれの医療機関も定員になり次第締め切りますので、予約は早めをお願いします。

裏面へつづく

《胃がん検診(胃内視鏡検診)について》

・胃がんはかつて、日本人に最も多いがんとして知られていました。近年は減少傾向にあります。日本人がかかりやすいがんであることに変わりはなく、男性におけるがん罹患率の2位(2017年)、女性は4位(2017年)となっており、早期発見・早期治療のために、2年に1度は胃内視鏡検診を受診することが重要です。

・胃内視鏡検査による胃がん検診は、死亡率減少効果はありますが、必ずがんを見つけられるわけではありません。逆に、がんがなくても結果が「要精密検査」となる場合もあります。(精密検査は、詳しい検査が必要という意味です。)

・精密検査が必要となった場合には、必ず詳しい検査を受けましょう！精密検査は、生検または胃内視鏡検査の再検査が必要になることがあります。

・検診及び精密検査結果について、本検診の有効性を評価するため、統計上報告される旨、ご了承ください。

胃がん

胃がんは日本人が最も多くかかるがんです。ピロリ菌は胃粘膜に住みつく細菌で、胃がんのリスクを上げることが分かっています。感染したからといって必ず胃がんになるわけではありませんが、感染が分かった場合は除菌療法が勧められます。

ピロリ菌の検査方法

(内視鏡を使わない方法)

●尿素呼気試験法

呼気(はき出した息)を採取して調べる方法です。ピロリ菌がもつウレアーゼのはたらきで作られる二酸化炭素の量を調べます。

●抗体測定法

尿や血液のピロリ菌抗原の有無を調べる方法です。

●抗原測定法

糞便中のピロリ菌抗原の有無を調べる方法です。

(内視鏡(胃カメラ)を使う方法)

●培養法

ピロリ菌を培養します。

●迅速ウレアーゼ法

ピロリ菌がもつウレアーゼの働きで作られるアンモニアの有無を調べます。

●組織鏡検法